









Fig. 2. Diffrattogramma relativo al camp. 2 "tal-quale".







a. Μπεντονικό τρηματοφόρο θρύμμα άλγης και ορείας κρυστάλλου (Quartz) πολυκρυσταλλικής. Nicols+, 65X.



b. Θρύμμα άλγης εγκλωβισμένο από σπατικό τσιμέντο σε μορφή οπτικής συνέχειας Nicols+, 65X.



α. Θρύμματα από άλγη και μεγάλα κενά μεταξύ των μορίων. Μερικά καθορισμένα από το φαινόμενο της αποσάθρωσης. Nicols+, 65X.



β. Εκτεταμένα φαινόμενα απώλειας συνοχής και διάλυσης με μεγάλη αύξηση της πορώτητας. Nicols+, 65X.






a. Μόριο πλαγιόκλαστου (στο κέντρο), ορεία κρύσταλλος (πάνω αριστερά) και διάφοροι τύποι βιοκλαστικών. Nicols+, 65X.



b. Μεγάλο μόριο από στρογγυλεμένο πολυκρυσταλλικό Quartz δίπλα από ένα θρύμμα από όστρακο. Παρατηρείται η μεγάλη ποσότητα από τσιμέντο άμορφου ασβεστίου που εξασφαλίζει μικρότερη πορώδη από εκείνη που παρουσιάζει το δείγμα A (βλ. φωτοδιάγραμμα Fig. 7). Nicols+, 65X.




a. Πλαγκτονικό τρηματοφόρο με το εσωτερικό του γεμάτο από σπατικό ανθρακικό ασβέστιο και θρύμμα άλγης. Nicols+, 65X.




b. Θρύμματα άλγης και μόριο ορείας κρυστάλλου στρογγυλεμένο στα δεξιά. Nicols+, 65X.





a. Βιοκλαστικό με όστρακο με κατασκευή από ακτινοειδείς ίνες και με το εσωτερικό του γεμάτο με άμορφο ανθρακικό ασβέστιο και ποσότητες από οξειδία και/ή υδροξειδία σιδήρου. Nicols+, 65X.




b. Μόριο Μικρόκλινου θραυσμένο πιθανότητα εξαιτίας φυσικών φαινομένων αποσάθρωσης, σε μια ζώνη όπου ιδιαίτερα είναι εμφανείς οι διαδικασίες αποσάθρωσης. Nicols+, 65X.





a. Μεγάλο μόριο ανέπαφου ορθόκλαστου. Nicols+, 65X.



b. Φαινόμενα απώλειας συνοχής που προκαλούν αποκόλληση των επιμέρους στοιχείων του πυρόλιθου. Παρατηρούνται ακόμα και φαινόμενα διάλυσης που μεγαλώνουν τα αρχικά κενά. Nicols+, 65X.